

Το προϊόν (Τρωκτικοκτόνο-Βιοκτόνο) χρησιμοποιείται για την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία αποθηκευμένων προϊόντων και τροφίμων και την προστασία υλικών (πχ ιστορικά κτίρια, τεχνικά αντικείμενα). Προορίζεται για την καταπολέμηση των οικιακών ποντικών (*Mus musculus*) και των καφέ αρουραίων (*Rattus norvegicus*) σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια) μέσω : α) καλυμμένης εφαρμογής, β) σε δολωματικούς σταθμούς.

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για προσβολές από ποντικούς χρησιμοποιείτε μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 2 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.

Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείτε μέχρι 90 γρ. δολώματος (σε φακελάκια) ή 100 γρ. δολώματος (σε δοχείο/σκαφάκι) ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.

Κάνετε τακτικές επεξεργασίες των θέσεων δόλωσης (συνιστάται κάθε 3 ή 4 ημέρες) και αναπληρώνετε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί. Στις περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους. Για να ελεγχθεί η εξαπλώση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Για την επιλογή του τρωκτικοκτόνου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του στοχευμένου πληθυσμού. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες χρήστες μόνο όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά στα χημικά (προδιαγραφών EN 374). Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσής τους από άλλα ζώα ή παιδιά.

Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δολώμα από παιδιά, πτηνά και μη στοχευόμενα ζώα (ιδιαίτερα από σκυλιά, γάτες, χοίρους και πουλερικά). Όπου είναι δυνατόν, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να απομακρυνθούν. Εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη από επαγγελματία χρήστη, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντιπηκτικό δολώμα θα πρέπει να επιτύχει τον έλεγχο των τρωκτικών εντός 35 ημερών. Εφόσον η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται μετά το πέρασμα των 35 ημερών, θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγγετε και/ή αναπληρώνετε τα δολώματα. Ενδεχομένως να απαιτείται καθημερινός έλεγχος σε ορισμένες περιπτώσεις. Να απορριπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο όπως επίσης και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης. Όταν χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας, θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και να μην παραβιάζονται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ: Απομακρύνετε όλα τα δολώματα μετά την εφαρμογή και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Τα νεκρά τρωκτικά και τα δολώματα εκτός δολωματικών σταθμών θα πρέπει να απομακρύνονται με τη χρήση προστατευτικών γαντιών.


ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία. Φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάξτε το μακριά από το φως. Χρονική διάρκεια σταθερότητας μέχρι 2 χρόνια.

Ημερομηνία Παραγωγής (Prod. Date):
Αριθμός Παρτίδας (Lot No.):

ΝΙΑΡ-ΝΕΟ PASTA

**BRODIFACOURM (ΒΡΩΔΙΦΑΚΟΥΜΗ) 0,0029%
ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ (RB)**

**ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ (ΒΙΟΚΤΟΝΟ)
Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των οικιακών ποντικών (*Mus musculus*) και των καφέ αρουραίων (*Rattus norvegicus*) σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια).**



Αριθ. Έγκρ. Κυκλοφ.
(ΥΑΑ&Τ):
ΤΠ14-0125 / 21-6-2017

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Κάτοχος της έγκρισης-Παρασκευαστής
σκευάσματος-Εργοστάσιο παρασκευής:
ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026
Conselve (Padova), ITALY

Υπεύθυνος επικοινωνίας & για την τελική
συσκευασία και σήμανση:
ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα

Εγγυημένη σύνθεση:

Brodifacourm 0,0029% β/β
Βοηθητικές ουσίες 99,9971% β/β
Περιέχει τον
πικραντικό-αποτρεπτικό
παράγοντα: denatonium benzoate
Χρώμα: ανοικτό κόκκινο

Αποκλειστική Διάθεση:
DELTA GAMMA AGRO A.B.E.E.

Αγ. Σοφίας, θέση Μηλιαδίστα
19300 Ασπρόπυργος, Αθήνα, Ελλάδα
ΤΗΛ: 210 2849412, 210 5595944
FAX: 210 2850352
email: dgagro@otenet.gr
www.dgagro.gr



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει θλάβες στα όργανα (στο αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
 - Μακριά από παιδιά.
- Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεχτή του προϊόντος.
 - Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Η

Βρωδιφακούμη (Brodifacourm) είναι ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία, η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης (INR) είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Βιταμίνη K1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777

Η πώλησή του επιτρέπεται σε συνεργεία
μυκτονιας που έχουν άδεια από το Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Καθαρό βάρος (Net weight):

4,5 ΚΙΛΑ (Kg)
(περιέχει δολώματα/φακελάκια
των 15 γραμμαρίων)